






——第1部分：取样指南；

——第2部分：检验样品的制备与稀释；

——第3部分：酵母、霉菌菌落计数；

——第4部分：嗜冷菌微生物菌落计数；

——第5部分：沙门氏菌检验；

——第6部分：柠檬酸杆菌检验；

附录A 检验检疫合格证明

5 测定方法

抽样和制样按 SN/T 2552.1 执行。无菌称取样品 100 g 至 2 L 的样品稀释瓶中,加入 900 mL 预热到 45 ℃ 的无菌蒸馏水,或者将样品直接称量到装有 0.1 g 样品且已预热到 45 ℃ 的无菌蒸馏水中。

样品稀释瓶中,振摇使样品充分混匀,36 ℃ ± 1 ℃ 培养 18 h ~ 22 h。

附 录 A
(细菌性附录)

培养基和试剂

A 1 肠杆菌增菌肉汤(EIE 肉汤)

A 1.1 成分

葡萄糖	5.0 g
磷酸氢二钠	8.0 g
氯化钠	2.0 g
牛胆盐	20.0 g
煌绿	0.015 g
蒸馏水	1 000.0 mL

A.1.2 制法

将各成分加入蒸馏

A.4 固定液


按顺序将下列各组分依次加入固定液瓶中，充分混合，即成。

即成。

A.5 pH9.0 碳酸盐-甘油缓冲溶液

溶解无水碳酸钠 6 g、无水碳酸氢钠 27 g 于蒸馏水中，加至 1 000 mL，充分混合，即成。

附录 B
(资料性附录)
间接法免疫荧光染色步骤示意图



行 业 标 准

进出口商品检验检疫行业标准