

中国公民出境入境管理法 中华人民共和国出入境管理法

118

www.kinghunt.cn
凯恒生物

中华人民共和国出入境检验检疫

行业标准

出口食品中霉菌的检验方法

SN/T 13124—2013

SN/T 13124

北京市延庆

延庆县

延庆县

延庆县

SN/T 13124

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国检验检疫监督管理委员会提出并归口。

本

www.kinghunt.cn
凯恒生物

山口食品株式会社

 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。各供试品置于(1)10% CO_2 、10% CO_2 和 50% N_2 。

2.3 微需氧培养表

2.4 拍击

2.5 电子

www.kinghunt.cn
凯恒生物

加入225 g






表 1 幽门螺杆菌的鉴定

[illegible]

5.4.2 5.4.2 氨基酸

5.4.7 微需氧条件下 42 ℃ 生长试验

挑取可疑菌落,接种到无抗培养基



附 录



A.1.4.2 试剂

1. 培养基

的试管或锥形瓶中。配制的增菌液在常温下放置。

将培养基加入琼脂表面和培养基表面，待培养基凝固后，将培养基放入冰箱冷藏，待培养基凝固后，将培养基放入冰箱冷藏。

温度放置

A.3 氧化酶试验 (for the detection of oxidase)

分

将苯胺蓝盐溶液 (A.3.1) 加入

100 mL。

www.inghant.cn
www.inghant.cn

称取 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 2.71 g;

将上述各物质溶于水中,

加水至 100 mL,

搅拌均匀,

即为标准溶液。

4.2.2 标准溶液的配制

称取 0.1000 g 磷酸二氢钾 (KH_2PO_4),

溶于水中,加水至 100 mL,

搅拌均匀,即为标准溶液。

4.2.3 标准溶液的配制

称取 0.1000 g 磷酸二氢钾 (KH_2PO_4),

溶于水中,加水至 100 mL,

搅拌均匀,即为标准溶液。

4.2.4 标准溶液的配制

称取 0.1000 g 磷酸二氢钾 (KH_2PO_4),

溶于水中,加水至 100 mL,

搅拌均匀,即为标准溶液。

4.2.5 标准溶液的配制

称取 0.1000 g 磷酸二氢钾 (KH_2PO_4),

溶于水中,加水至 100 mL,

搅拌均匀,即为标准溶液。

4.2.6 标准溶液的配制

称取 0.1000 g 磷酸二氢钾 (KH_2PO_4),

溶于水中,加水至 100 mL,

搅拌均匀,即为标准溶液。

4.2.7 标准溶液的配制

称取 0.1000 g 磷酸二氢钾 (KH_2PO_4),

溶于水中,加水至 100 mL,

搅拌均匀,即为标准溶液。